

Skurðviðgerð fyri forhúðstronga

Tú kanst vænta nakað av þínu teir fyrstu dagarnar eftir skurðviðgerðina. Neyðugt kann vera at taka þínustillandi heilivág, t.d. Paracetamol, 1 gr. í mesta lagi 4 ferðir um samdøgrið, ella annan hondkeypsheilivág.

Tú færst eina tubu frá okkum av lokaldoyvandi kremi, sum tú kanst nýta áðrenn og aftaná tú hefur kasta tær av vatninum, og um tað sviður í sárinum.

Tað er ikki óvanligt at tað hovnar um sárið, men hetta hvørvur uttan viðgerð.

Tað tú sjálvur kanst gera:

Til at fyrbyggja at tað hovnar um skurðin, legg penis upp á búkin tað fyrsta samdøgrið.


Sárið er seymað við sjálvuploysiligum tráði, og eru hesir ikki horvnir eftir 14 døgum, far so til kommunulækna.

Halt sárið reint, skola við lunkaðum vatni í 1-2 minuttir dagliga ta fyrstu vikuna.

Rátt verður frá at hava samlegu ella onanera fyrstu 3 vikurnar.

Vinarliga

Starvsfólkið á Skurðdeplinum



Landssjúkrahúsið

tel 304500, www.ls.fo