



Landssjúkrahúsið



Epidural

Epidural pínuviðgerð

Í sambandi við serstakar skurðviðgerðir verður eitt epidural-kathetur lagt inn í rygginn, tað er í rúmið runt mognuna (epiduralrúmið), ætlað til pínuviðgerð undir og eftir skurðviðgerð.

Medisin verður sprænt inn við pumpu í eini nøgd, sum er hóskandi til skurðviðgerðina.

Hvussu verður epidural-kathetur lagt?

Í síðulegu verður lokaldoyving sprænd í húðina. Ígjøgnum eina nál verður eitt sera tunt plastrør (epidural-kathetur) ført inn í epiduralrúmið. Nálin verður tikin burtur og epidural-kathetrið verður fest við plástri. Kathetrið er so klænt, at hetta ikki merkist, tá ligið verður á bakinum.

Hetta tekur uml. 10-15 min.

Hvussu virkar pínuviðgerðin?

Tá lokaldoyving verður sprænd inn í epiduralrúmið, forðar tað fyri, at pína flytur seg frá skurðstaðnum til ryggmognuna. Í stuttum kann sigast, at heilin fær als ikki boð um nakra pínu.

Hvussu nógv medisin tolir ein?

Eingin vandi er fyri medisineitran í sambandi við epidurala pínuviðgerð. Medisin verður givið, sum er hóskandi til skurðviðgerðina.

Hvussu leingi skal epidural-kathetrið nýtast?

Triðja dagin verður kathetrið aloftast tikið burtur, og pínuviðgerðin heldur fram við medisini í droppið ella við tablettum eftir tøvri.

Eru hjáárin í sambandi við epidurala pínuviðgerð?

Tað eru sjúklingar, sum kenna vaml ella hava svimbul, og nakrir kenna minni megi í beinunum. Hjáárinini hvørva, tá viðgerðin er liðug.

Komplikatióinir í sambandi við viðgerðina?

Tær eru fáar. Uml. 1% fáa hovuðpínu í sambandi við epidurala pínuviðgerð. Hovuðpínan er ikki vandamikil og hvørvur ein til tveir dagar eftir viðgerðina.

Verður epidural-kathetrið liggjandi meiri enn tríggjar dagar, økist váðin fyri, at bruni kemur rundan um kathetrið í rygginum. Sjúkrarøktarfrøðingur kannar regluliga epidural-kathetrið og húðina runt kathetrið. Epidural-kathetrið verður aloftast tikið burtur triðja dagin, um støðan hjá sjúklinginum loyvir tí.

Pínuviðgerð eftir skurðviðgerðina?

Anesthesilæknin ger eina ætlan um, hvørja pínuviðgerð tú skalt hava eftir skurðviðgerðina. Við medisini í epidurala kathetrinum er møguligt at gerast nærum pínuleys/-ur.

Tú skalt vera pínuleys/-ur tá tú liggur friðarlig/-ur í seingini.




Hostar tú ella skalt tú úr seingini, verður pínan størri,, men hon má ongantíð gerast so ring, at tú ikki torir at hosta ella flyta teg í seingini. So er neyðugt at broyta pínuviðgerðina.

Fyri nágreiniligari at meta um pínuna verða brúkt tøl frá 0 – 10:

0 = Pínuleys/-ur

10 = Sera nógv pína



Ide: Doc. Staffan Amér. Karolinska Sjukhuset

Tú skalt við tølunum meta um pínuna:

Frá 0 – 3 = Ikki nógv pína

Frá 4 – 5 = Pína í smb. við hosta og flyting í og úr seingini.

Er pínan millum 4 – 5 í hvílustøðu, skal pínuviðgerðin broytast.

Frá 6 – 10 = Sera nógv pína. Pínuviðgerðin skal broytast.

Vegna Anesteseidildina

Elin H. Jensen, anestesiyrirlækni

Jonna O. Hansen, anestesisjúkrarøktarfrøðingur



Landssjúkrahúsið

tel 304500, www.ls.fo