



**Barnið hefur
sligið seg í -
lítil heilaskjálvti**

Lítill heilaskjálvti

Í hesum faldara kunnu tit lesa, hvat tit skulu leggja til merkis, um barn tykkara hefur sligið hævdið í.

Vegleiðingin gevur góð ráð um, hvat barnið skal gera, og hvat tit sum foreldur skulu vera varug við.

Ráðini í vegleiðingini skulu fylgjast fyrstu dagarnar eftir tilburðin. Tó er tað serliga týðningarmikið at halda eyga við barninum tað fyrsta samdøgrið eftir tilburðin. Í hesum tíðarskeiði skal barnið ikki vera einsamalt, og teir fyrstu tímarnar eftir tilburðin skal barnið vekjast tvær til tríggjar ferðir; hetta fyri at eftirkanna støðuna.

Fyrsta døgnið skal serliga ansast eftir, um barnið:

- verður meiri dølaskt og fjálturstungið,
- er tungt at vekja,
- vísir tekin til meira hævði, vaml ella spúr,
- fær krampar

Skuldu onkur av hesum sjúkueyðkennum víst seg, ella kenna tit tykkum sum foreldur onkursvegna ótrygg við støðuna hjá barni tykkara, skulu tit seta tykkum í samband við antin kommunulækna, kommunulæknavaktina ella skaðastovuna.

Tá barnið hefur sligið hævdið í, hefur tað serliga tørv á hvíld og friði; hetta fyri at eftirrákið frá heilaskjálvtanum, sum serliga kann vera afturvendandi hævði, skal hvørva av sær sjálvum.



Góð ráð eru tí, at barnið:

bindur frið teir fyrstu dagarnar eftir tilburðin,
ikki luttekur í ógvusligum spæli ella ítrótti,
ikki hyggur eftir sjónvarpi ella spælir teldu ov leingi í senn
Um barnið framvegis hefur sjúkueyðkenni tveir dagar aftaná løstin, eigur tað at verða eftirkannað hjá lækna.

Góðan bata!

Kommunulæknavaktin og
Skaðastovan á Landssjúkrahúsinum