



Landssjúkrahúsið



**Blóðtynnandi aftaná keisaraskurð**

## **Vegleiðing í at sroyta seg við Fragmin (blóðtynnandi) í búkin:**

Tak við 2 fingrum um eina húðarlegd á búkinum (sí mynd). Prika nálina í húðarlegdina við einum vinkli uppá uml. 45°. Trýst stemplið spakuliga í botn (uml. ½ min.), bíða í nøkur sekund, so vætan kann spjaða seg undir húðini, áðrenn nálin verður tikin úr aftur.




2

Mynd: Fragmin verður sroyta inn í húðarlegd.

Fragmin eigur at vera sroytað beint undir húðina, í einum U-formaðum umráði, niðanvert nalvan (sí mynd) – í minsta lagi 5 cm. frá nalvanum. Fragmin kann eisini sroytast í lærið.

Fragmin sroytan inniheldur eina luftbløðru. Hendan skal ekki koyrast úr áðrenn sroytað verður, men skal liggja við stemplið, soleiðis at luftbløðran verður sroytað gjøgnum nálina at enda. Hetta ger, at onki Fragmin verður eftir í nálina.



Mynd: U-formað umráði

## **Gevið gætur !**

- **Sproyturnar skulu goymast í stovuhita – í mesta lagi 25°**
- **Sproyta teg um somu tíð hvønn dag**
- **Minst til at koyra proppin á aftur nálina, áðrenn sproytan verður burturbeind á tryggan hátt, t.d. í einum tómum mjólkarpakka.**



**Landssjúkrahúsið**

Føðideildin

[www.ls.fo](http://www.ls.fo)