



Landssjúkrahúsið

Sekretión

Einasta indikati3n fyri 3vísing til mammografi er spontan og kontinuerlig sekretión av bl333 ella ser3sari v3etu fr3 einum br3sti. Sj3lvt t3 omanfyrenevndu symptom eru til sta3ar er eingin illgruni um br3stkrabba. Ta3 er einans illgruni um papillom, sum er ein benign broyting.

Kvinnur undir 25 3r

Hava t3ttan br3stvevna3 og teir palpablu kn3tarnir eru fibroadenom ella t3ttur br3stvevna3ur.

Eingin grund er til n3erri diagnostik. Biopsi verður ikki gj3rt upp3 fibroadenom í hesum aldrinum.

Ættarbregi

Ver3ur mett sum screeningspopulati3n. Serlig 3ttarbregi so sum BRCA eigur at ver3a umsiti3 av einum serl3ekna. Send 3vísing til Br3stkirurgiskt ambulatorium.

Í vi3gongu og post partum

Útvikla ofta sokalla3ir mj3lkaknútar. Kunnu kontrollerast kliniskt í fyrstu atl3gu.



Landssjúkrahúsið

R3ntgendeildin tel 304500 www.ls.fo



3vísing til mammografi

Ávísing til mammografi

Í Føroyum er ikki sett á stovn mammografi screening. Uppgávan hjá einari kliniskari Røntgendeild er at diagnostisera kliniskt suspektan bróstkrabba. Seinasta árið eru ávísingarnar til mammografi nær um tvífaldaðar. Í løtuni eru nær um 200 kvinnur sum bíða eftir mammografi. Hetta gevur ábending um at skipanin verður brúkt sum ein screening. Framyvir verður mammografi einans gjørt um talan er um manifestan kliniskan illgruna um bróstkrabba. Ein kliniskur bróstkrabbi er ein palpabel malignitetssuspektur knútur. Einans ávísingar við nevndu indikatiónum verða móttiknar frá kommunulæknum og øðrum serlæknum.

2

Ávísingin SKAL eisini innihalda

Lokalisatiónum:

- Síða (Høgra/Vinstra)
- Kvadrant (Ovara laterali, ovari mediali, Niðari laterali, niðari mediali)
- Klokutíma og avstandur frá mammillina

Um operatiónum er gjørd:

- Ja /Nej og greining av um talan er um Malignitet/Benignitet, Mastektomi, Lumpektomi, Reduktionsplastik, Protesur.
- Um eldri malignitet ynskist eisini árstal.

Palpabli eitlar í axillini: Ja/Nej.

Aðrir co-existerandi faktorar: so sum inverterað mammill, inflammatiónum og ulceratiónum kunnu nevast um hesir eru til staðar.

Aðrar upplýsingar kunnu útilatast!

Um omanfyrinevndu treytir ikki eru uppfyltar, verður ávísingin send retur.

Onnur vanlig symptomir frá bróstum

- Í stuttum kann sigast, at bróstdiagnostik ikki fevnir um pínum í sambandi við fibroadenomasu ella eini ungdómsmóttøku. (sí næstu síðu)

Palpabel ikki-malignitetssuspektur knútur.

-Kvinnur millum 15-30 ár útvikla Fibroadenomir. Fibroadenomir kunnu kontrollerast kliniskt.

- Kvinnur millum 40-50 ár útvikla Cystir. Cystaspiratiónum kann gerast í almen praksis.

Pína í bróstum

Allar kvinnur uppliva hetta, og tað er aldrin bróstkrabbi. Tað er ein hormonell ávirkan á bróstvevnaðinum, og ikki illgruni um bróstkrabba.

3