



Heilsuverk Føroya



PKU-screening for CTD

Ekstrascreening 4 uger efter fødsel

Heilsuverk Føroya

2016

Ekstra blodprøve for CTD (Carnitin Transporter Defekt)

For at sikre den nuværende blodprøve på nyfødte for CTD (PKU-prøven) bliver alle nyfødte tilbudt en ekstra blodprøve til undersøgelse af karnitinindholdet i blodet 4 uger efter fødslen.

Baggrund

Undersøgelser har vist, at karnitinindholdet i blodet hos nyfødte er påvirket af moderens karnitinindhold, når PKU-testen bliver lavet 2-3 dage efter fødslen. Derfor er der en risiko for, at PKU-prøven ikke kan påvise CTD hos nyfødte.

Påvirkningen fra moderen forsvinder efter et par uger, hvorfor en ekstra blodprøve tilbydes for at sikre, at alle børn, som har sygdommen CTD, bliver diagnosticeret og sat i behandling med karnitintilskud.

Procedure

Inden du bliver udskrevet fra fødeafdelingen, får du udleveret en blodprøveseddel. I møder op i laboratorierne ambulatorier på Landssygehuset, Klaksvig- eller Suderø Sygehus ca. 4 uger efter fødsel. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Svar

Blodprøven bliver sendt til København til undersøgelse. Hvis der bliver målt usædvanlig lavt karnitinindhold i blodet, vil I blive kontaktet af en læge, som vil lave nogle flere undersøgelser på Landssygehuset.

Åbningstider for landets ambulatorier

Landssjúkrahúsið

Ambulatorium i Útistovu (Blå bygning)
hverdage kl. 08:00-11:00

Klaksvíkar Sjúkrahús

På sygehuset hverdage kl. 08:00-10:00
På Læknamiðstöðini i Gøtu torsdag kl. 08:15-09:30
På Læknamiðstöðini i Runavík tirsdag kl. 08:30-10:00

Suðuroyar Sjúkrahús

På sygehuset hverdage kl. 08:00-13:00
På Heilsumiðstöðini i Vági tirsdag og torsdag kl. 09:00-11:00